

► Dr John KRETCHNER - Chirurgien dentiste à Triel sur Seine

Dentiste Yvelines - Implant dentaire, esthétique du sourire, soins gencives

📍 34 bis avenue de Poissy 78510 Triel sur Seine

☎ Tel. : +33 1 39 74 45 75

🌐 dr-kretchner-john.chirurgiens-dentistes.fr

Prothèses amovibles partielles

Une prothèse amovible partielle remplace les dents manquantes. Elle est dite partielle lorsque des dents demeurent sur les arcades dentaires.

LES PROTHÈSES PARTIELLES ENTIÈREMENT EN RÉSINE

- > Grâce à une empreinte réalisée au cabinet, le prothésiste réalise une plaque en résine rose dans laquelle sont intégrées des dents artificielles en résine ou en céramique.
- > Des attaches sont positionnées de façon stratégique au niveau de la prothèse pour la stabiliser et la retenir pendant la mastication et l'élocution.
- > L'appareil s'appuie uniquement sur les gencives.
- > Ces prothèses en résine sont faciles et rapides à réaliser. Elles sont également moins onéreuses.
- > Aujourd'hui, elles sont surtout utilisées comme appareils transitoires.



LES PROTHÈSES PARTIELLES À CHÂSSIS MÉTALLIQUE (OU STELLITE)

Ce sont des appareils plus élaborés, qui permettent de mieux préserver la gencive et les dents restantes.

- > En général, deux empreintes successives sont nécessaires, à l'issue desquelles le prothésiste réalise une armature métallique. Elle s'apparente à un squelette qui sert d'échafaudage pour le soutien de la résine rose et des dents artificielles.
- > Grâce au châssis métallique, ces prothèses peuvent s'appuyer non seulement sur la gencive mais aussi sur les dents, ce qui répartit mieux les forces.
- > Les dents naturelles restantes, en contact avec les crochets, peuvent être légèrement préparées pour stabiliser l'appareil, voire couronnées si elles sont fragiles.

FIXATION DE LA PROTHÈSE

Certains crochets situés sur les dents de devant peuvent être disgracieux. Il est possible de placer des éléments plus esthétiques ou bien d'utiliser des systèmes appelés « attachements », qui permettent de les supprimer tout en garantissant la stabilité de l'appareil.

À SAVOIR

Si vous portez une prothèse amovible partielle pour la première fois, il vous faudra éventuellement un peu de temps pour vous y habituer.

Nous sommes là pour vous conseiller et pour faire les réglages destinés à améliorer votre confort.

